ISAR DENTAL
BAYRISCHES MEISTERLABOR

Richtiges Einsetzen und Herausnehmen

Bitte setzen Sie Ihren herausnehmbaren Zahnersatz ausschließlich mit Hilfe Ihrer Finger ein. Bevor Sie das erste Mal zubeißen, sollte der Zahnersatz in der endgültigen Position sitzen.



PFLEGEHINWEISE

Für herausnehmbare Versorgungen

ISAR DENTAL zahntechnisches Labor GmbH
Breslauer Weg 77
82538 Geretsried

+49 (0)8171 9334-0
info@isar-dental.de
isardental.com

PFLEGEHINWEISE

Für herausnehmbare Versorgungen

TÄGLICHE REINIGUNG

- Säubern Sie herausnehmbaren Zahnersatz zweimal am Tag gründlich mit einer Zahnbürste, möglichst nach den Mahlzeiten
- Um einem versehentlichen Herunterfallen vorzubeugen, ist das Reinigen des Zahnersatzes über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken oder einem gefalteten Handtuch empfehlenswert
- Verwenden Sie keine Zahnpasta (mit Schleifmittel), nutzen Sie eine Zahnbürste mit harten Borsten und Zahngel. Alternativ können Sie auch eine spezielle Prothesenbürste nutzen. Im Gegensatz zu normalen Zahnbürsten hat sie ein zweites Borstenfeld zur Reinigung der Prothesenbasis.
- Reinigen Sie besonders gut die Außen- und Innenflächen, mit denen der Zahnersatz auf dem Gaumen und Zahnfleischkamm aufliegt

Pflege der Schleimhäute

- Die Schleimhäute werden stark beansprucht, zumal ihnen unter dem Zahnersatz die reinigende und desinfizierende Wirkung des Speichels fehlt und sich Bakterien und Pilze hier leichter vermehren können.
- Gönnen Sie Ihren Schleimhäuten täglich eine Massage und Reinigung. Nehmen Sie etwas Zahnpasta oder Gelee und massieren mit einer weichen Zahnbürste über die von dem Zahnersatz bedeckten Bereich
- Anschließend desinfizieren Sie die Mundhöhle durch Umspülen mit einer Mundspüllösung. Diese sollte kein Chlorhexidin (CHX) oder Alkohol enthalten

Lagerung in der Nacht

- Gut sitzende Versorgungen können in der Nacht im Mund behalten werden
- Bei Herausnehmen des Zahnersatzes in ein mit Wasser gefülltes Glas legen (ohne Reinigungstabletten)

Regelmäßige Vorsorge bei Ihrem Zahnarzt /Ihrer Zahnärztin:

Auch mit Zahnersatz ist die halbjährliche Kontrolle und Prophylaxe in der Zahnarztpraxis notwendig.